

Emerade®

uw noodhulp



GA NAAR [HTTPS://EMERADE-BAUSCH.NL/](https://emerade-bausch.nl/)

- Bekijk de instructievideo



- Leer meer over anafylaxie
- Vraag een Emerade® trainerpen aan.
- Trainerpennen moeten apart van actieve Emerade® pennen worden bewaard om mogelijke verwarring te vermijden.



- Elke pen waarvan men vermoedt dat deze niet heeft gewerkt zoals bedoeld, moet worden bewaard voor onderzoek. Deze niet werkende pennen moeten worden ingeleverd bij uw dichtsbijznde apotheek.

Emerade® is een geneesmiddel dat uitsluitend op recept te verkrijgen is (U.R.). Het is van essentieel belang dat u de bijsluiters voor de patiënt leest. Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven spontane meldingen van groot belang. In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl). Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product. Zie onderaan deze brochure voor contactinformatie. Aanvullende informatie betreffende Emerade, adrenaline, is beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SKP) en bijsluiters op www.cbg-meb.nl

Bausch+Lomb Pharma nv - Lambertmontaan 430 - 1030 Brussel - België
Tel: +31 (0)20 20 61 662 - Email: csbenelux@bausch.com

Deze educatieve brochure en de Emerade® trainerpen om te oefenen kunnen besteld worden via <https://emerade-bausch.nl/> en via de arts.

(NL) 22 06 EME BPO PM1 - 06/22

BAUSCH + LOMB

Lambertmontaan 340 | 1000 Brussel | België
csbenelux@bausch.com | +31 (0)20-2001462

Emerade®

uw noodhulp

HOE TE BEWAREN

- Bewaar Emerade® beneden 25°C. Emerade® mag niet in de vriezer. Emerade® moet altijd bewaard worden volgens de bewaaromstandigheden op het etiket. Bewaar de pen niet bij hoge temperaturen.



- Controleer de oplossing regelmatig door het kijkvenster van de pen, door het optillen van het etiket bij de pijl, om zeker te zijn dat de oplossing helder en kleurloos (doorzichtig) is. Gooi de Emerade® pen weg en vervang de pen als de oplossing een andere kleur heeft gekregen of als de oplossing troebel is of korreltjes bevat.
- Emerade® is verpakt in een stevige plastic étui, verpakt in een buitenverpakking. Bewaar Emerade® in de plastic bescherm-étui. De pen(nen) en de bijsluiters moeten altijd in deze étui worden bewaard. Het étui kan in de kartonnen buitenverpakking worden bewaard.



EENVOUDIG EN VEILIG IN GEBRUIK

- Emerade® heeft één naalduitgang.
- Er is een automatische naaldbescherming na gebruik om te beschermen tegen prikongelukken.

TJDENS EEN VLUCHT

- Emerade® mag meegenomen worden in de handbagage. Het cabinepersoneel is hiervan mogelijk niet op de hoogte. De patiënt kan een reiscertificaat printen via <https://emerade-bausch.nl/> om te laten tekenen door de arts voordat de patiënt op reis gaat.



INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Emerade®

Adrenaline tartraat 150, 300, 500 µg



MEER INFORMATIE OVER UW ADRENALINE AUTO-INJECTOR

VOOR DE NOODBEHANDELING VAN ANAFYLAXIE



DE RISICO MINIMALISATIE MATERIALEN VOOR EMERADE® (ADRENALINE), ZIJN BEOORDEELD DOOR HET COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN (CBG). DEZE MATERIALEN BESCHRIJVEN AANBEVELINGEN OM BELANGRIJKE RISICO'S VAN HET GENEESMIDDEL TE BEPERKEN OF TE VOORKOMEN

BAUSCH + LOMB

HOE GEBRUIKT U EMERADE® ?

Emerade® is intuïtief en gemakkelijk in gebruik.

Voor gebruik moet u de bijsluiters goed lezen, en bij nood de gebruiksaanwijzing op de pen volgen.

In overleg met uw arts kunt u **twee adrenaline** pennen bij u dragen.

Controleer de vervaldatum op uw adrenaline pennen en **vraag uw arts om nieuwe voor te schrijven voor de vervaldatum**. Een vervallen adrenaline pen werkt mogelijk niet.

Injecteer zelf in de buitenkant van de dij bij de eerste tekenen van een ernstige allergische reactie.



Verwijder de kap

Plaats Emerade® tegen de buitenkant van de dij (de zijkant van uw bovenbeen) onder een hoek van 90° en druk stevig zodat de naaldbeschermer ingedrukt wordt. U zult een klik horen als de pen geactiveerd wordt en de naald in de dij is gedrongen.

EN

HOUD gedurende 5 SECONDEN volledig ingedrukt. Masseer daarna licht de injectieplaats, bij dan onmiddellijk 112 en zeg «Anafylaxie», (uitgesproken als «ana-fie-laksie»), zelfs als u zich beter begint te voelen.

Lig plat met de benen omhoog om het bloed te laten stromen. Als u moeite krijgt met ademen, moet u mogelijk rechtop gaan zitten om het ademen makkelijker te maken.

Indien u hiertoe in staat bent, zoek onmiddellijk hulp na gebruik van uw pen. Indien mogelijk, moet u vermijden om alleen te zijn terwijl u op de ambulance wacht.

Een Emerade® pen kan niet hergebruikt worden. Wanneer de ernstig allergische klachten niet minder worden, kan een tweede injectie van Emerade® toegediend worden 5 tot 15 minuten na de eerste injectie.

Om deze reden, kunt u een tweede Emerade® pen voorgeschreven krijgen. U moet dan altijd twee pennen bij u hebben. Uw arts kan u hierover meer vertellen.

Hoe kunt u controleren of uw Emerade® pen geactiveerd is en adrenaline heeft afgegeven?

Na het gebruik van de Emerade® pen, kunt u controleren of de pen geactiveerd is. Onderstaande afbeeldingen zijn van toepassing op alle doses Emerade® (150 microgram, 300 microgram en 500 microgram).

De ongebruikte Emerade® pen (vóór activering) met de naaldbeschermer in normale positie.



Een geactiveerde Emerade® pen heeft een verlengde naaldbeschermer.



Als de naaldbeschermer niet is uitgeschoven, is de auto-injector niet geactiveerd.

De pijl op het etiket van de pen geeft aan waar het etiket kan worden opgetild om het kijkvenster te zien.

Als in het kijkvenster nog steeds heldere vloeistof zichtbaar is (adrenaline-oplossing), heeft de pen de dosis adrenaline niet met succes afgegeven.

Een Emerade pen die geactiveerd is en met succes een dosis adrenaline heeft afgegeven, vertoont een gekleurde zuiger in het kijkvenster (zichtbaar door het etiket bij de pijl op de pen op te tillen).



Emerade® 150 microgram: het kijkvenster onder het etiket wordt geel zodra Emerade® is geactiveerd en adrenaline heeft afgegeven.



Emerade® 300 microgram: het kijkvenster onder het etiket wordt groen zodra Emerade® is geactiveerd en adrenaline heeft afgegeven.



Emerade® 500 microgram: het kijkvenster onder het etiket wordt blauw zodra Emerade® is geactiveerd en adrenaline heeft afgegeven.

Als een Emerade adrenaline pen niet onmiddellijk geactiveerd kan worden, moet er een extra poging ondernomen worden gebruik makende van een verhoogde kracht wanneer de pen tegen de bedoelde injectieplaats wordt gedrukt. Indien niet succesvol, moet u onmiddellijk een tweede pen gebruiken.

WANNEER GEBRUIKT U EMERADE® ?

Emerade® is bedoeld voor de spoedbehandeling van ernstige acute allergische reacties (anafylaxie), veroorzaakt door voedingsmiddelen, geneesmiddelen, insectenbeten, of andere allergenen alsook voor inspanning-geïnduceerde of idiopathische anafylaxie.

Symptomen van anafylaxie kunnen zijn:

- Moeilijke ademhaling, piepende ademhaling
- Jeuk, vooral onderaan de voeten, aan handen en hoofd
- Prikkend gevoel in de mond
- Zwelling van de mond, keel, lippen of ogen
- Jeuk, roodheid of netelroos ergens op het lichaam
- Duizeligheid, verwardheid, koud zweet
- Buikpijn, misselijkheid of braken
- Plotselinge moeheid, verlaagde bloeddruk of flauwvallen
- Gevoel van desoriëntatie of verlies van bewustzijn
- Zwakke pols



Symptomen kunnen zich snel ontwikkelen binnen enkele minuten of uren na contact met een allergeen.

Kritieke symptomen

U vindt het moeilijk om te ademen, de mond of keel zwelt, u voelt zich plots moe en duizelig. U heeft huiduitslag (blozen, jeuk, netelroos). Deze huiduitslag kan langzaam erger worden.

- **Als u deze kritieke symptomen ervaart, moet Emerade® onmiddellijk geïnjecteerd worden.**
- **Bel onmiddellijk 112 en vraag om een ambulance en zeg 'anafylaxie' (uitgesproken als «ana-fie-laksie-») zelfs als u zich beter begint te voelen.**

Adrenaline helpt uw bloeddruk te verhogen, stimuleert uw hart en verbetert uw ademhaling. U MOET EMERADE® ALTIJD BIJ U DRAGEN.

